


LET OP! DEZE INSTRUCTIEKAART IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR FOCETRIA® VAN NOVARTIS.
Gebruikt u Pandemrix® van GlaxoSmithKline, raadpleeg dan de betreffende instructiekaart.

Het gereedmaken en toedienen van FOCETRIA®


Focetria® wordt geleverd in flacons van 5,0 ml. Dit zijn **10 doses van 0,5 ml**.

STAP 1




Neem een flacon uit de verpakking. Laat de flacon op kamertemperatuur komen. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

STAP 2




Schud de flacon enkele malen voorzichtig. Het vaccin is dan een homogene, melkwitte vloeistof.

STAP 3



Controleer de inhoud van de flacon op vreemde deeltjes of duidelijke kleurafwijkingen. Als een van deze afwijkingen wordt gezien, mag het vaccin niet worden gebruikt.


STAP 4



Alvorens het vaccin toe te dienen, moet men er zeker van zijn dat er geen contra-indicatie bestaat bij de bewuste patiënt.

- ⊗ Schud de flacon enkele malen voorzichtig vóór elke toediening.
- ⊗ Trek in de bijgeleverde spuit (BD Flu+) van 1,0 ml met vaste naald één dosis van 0,5 ml vaccin op uit de flacon.
- ⊗ Dien het vaccin door middel van een **intramusculaire injectie** toe in de bovenarm (Musculus deltoideus) van de patiënt.
- ⊗ Plaats het beschermkapje niet terug op de naald en werp spuit + naald weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
- ⊗ Plak de injectieplaats af met een pleister.

LET OP! Indien niet alle 10 doses uit een flacon in één vaccinatie-sessie kunnen worden toegediend, mogen de resterende doses binnen 28 dagen na de toediening van de eerste dosis nog worden gebruikt, mits de flacon gedurende die tijd bij +2°C tot +8°C wordt bewaard. Langer bewaard vaccin moet weggegooid worden. Zodra een dosis vaccin (0,5 ml) in een spuit is opgetrokken, moet deze binnen 15 minuten worden toegediend.



ZO HOUDEN WE
GRIP OP GRIEP

www.rivm.nl/nieuwe-influenza